

Barna varangy (Bufo bufo)

{gallery}Bvarangy{/gallery}

Ezt a Magyarországon általánosan elterjedt békafajt leginkább vonuláskor a szaporodóhelyek körüli autóforgalom és az emberi hiedelmek miatti pusztítás veszélyezteti. Szerencsére már terjedőben vannak az utak mentén a természetvédők által épített békamentő kerítések, melyekkel nagyon sok példány életét mentik meg. További problémát jelentenek a kiszáradó vízállások szaporodási időben.

Magyarországon VÉDETT Ismertetőjegyek

Egyik legnagyobbra növő békánk, a nőstények nem ritkán elérik a 14 centimétert, míg a hímek max 8 centiméteresre nőnek. Háta szürkés, vagy olajbarna, tele a jellegzetes szemölcsökkel, 'varangy'-okkal. A szeme narancsos alapú, fekete vízszintes ívelt pupillával, fültömireggy kifejezett, jellegzetes félhold alakú. Szaporodás idején a hímeken megduzzadnak a hüvelykgumók, így könnyebben tudják a nőstényeket átölelni. Leginkább mászik, ritkán ugrik, azt is inkább akkor, ha megriad. Ragadozók elleni védekezésül felfújja magát és próbálja magát nagyobbak mutatni. Élőhelye

A barna varangy Európában, valamint Nyugat- és Közép-Ázsiában általánosan elterjedt, de hiányzik a legészakibb részektől. Magyarországon bárhol találkozhatunk vele, ahol megfelelő nappali búvóhelyet talál magának, hiszen leginkább szürkületben és éjjel aktív. Búvóhelyének fák gyökereit, kövek alját, üregeket, lakott területen pincéket, vízóra aknát választ magának. A vizektől távolabb is előfordulnak, a vízhez csak szaporodáskor kötődnek, szaporodás után eltávolodnak onnan. Érdekeség, hogy a barna varangy oda tér vissza szaporodni, ahol ő is született. Teleléshez leginkább üregeket választ, de házak pincéiben és egyéb védett helyeken is átvészeli a zord időszakot.

Szaporodás

A téli hibernált állapot után azonnal felkeresi a szaporodóhelyeket és már február végén, márciusban nagy tömegben gyülekeznek. Szaporodóhelynek mocsaras részeket, erdők mezők állandó pocsolyáit, csatornákat, árkokat választ, de lakott területen akár kerti tavakban is szaporodnak. Kétsoros, több ezer petéjét a vízínövényekre, tereptárgyakra tekerve rakja le, majd elhagyja a vizet. A lárvák gyorsan fejlődnek, 1-2 hónap után elhagyják a vizet, ekkor 0,5 centiméteresek és hozzávetőlegesen 1 gramm súlyúak. Táplálék

A barna varangy testméretéből adódóan viszonylag nagyobb falatokat is elfogyaszt, így előfordul, hogy fiatal egereket, pockokat is elkap, de jellemzően házatlan csigákat, rovarokat, pókokat és férgeket fogyaszt.

BARNA VARANGY (HANG)